

Số: 31/TB - TTDVNN

Kim Thành, ngày 26 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật gây hại thời gian qua và dự báo sinh vật gây hại thời gian tới

I. Thời tiết và cây trồng

1, Thời tiết

Trong thời gian qua, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu cuối mùa, nhiệt độ giảm thấp hơn, trung bình 24-28°C, ẩm độ trung bình 75-85%, trời có mưa rào và giông.

2, Cây trồng

- Cây lúa: Tổng diện tích gieo cấy lúa của toàn huyện là 4.000 ha, trong đó:
 - + Trà xuân sớm: diện tích 920 ha, gồm các giống: Nếp 415, nếp DT22, ... đang giai đoạn đòng già - trổ thoát.
 - + Trà xuân muộn: diện tích 3.080 ha, gồm các giống: Q5, ĐQ11, TBR225, Thiên ưu 8, TBR279, TH6-6,... đang giai đoạn đứng cái - đòng.

II. Tình hình sinh vật gây hại trong thời gian qua

- Chuột: Gây hại rải rác trên lúa ở các xã, thị trấn trong toàn huyện, tỷ lệ hại trung bình 3-5% dảnh, cao 7-10% dảnh, cục bộ có ruộng bị hại nặng 20-30% dảnh. Diện tích bị chuột hại 2.5ha, tập trung gây hại ở các vùng trũng thấp, vùng chuyên đổi, nương máng, các khu gò đồng, trên những ruộng lúa xanh tốt,...

- Sâu cuốn lá nhỏ: trưởng thành ra rộ từ ngày 24/4/2023 trên diện tích lúa xuân muộn giai đoạn đứng cái - đòng, tập trung ở ruộng xanh tốt, bón thừa đạm, cấy dày. Mật độ trưởng thành trung bình 0.1 - 0.2 con/m², cao 3-4 con/m², sâu gói lúa của lúa 2.

- Bệnh đạo ôn cổ bông: xuất hiện trên một số ruộng lúa đã trổ.

- Bệnh khô vằn: gây hại trên các trà lúa ở tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện với diện tích 300 ha. Bệnh gây hại chủ yếu ở những ruộng xanh tốt, bón thừa đạm, cấy dày, tỷ lệ bệnh trung bình 3-5% dảnh, cao 7-10% dảnh, chỉ số bệnh Cấp 3-5.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: do ảnh hưởng của mưa rào và giông vừa qua, bệnh phát triển và gây hại nhẹ trên lúa xuân sớm.

Ngoài ra, trên lúa còn xuất hiện một số đối tượng sinh vật gây hại khác như: Bệnh vàng lá, bệnh lem lép hạt, rầy (rầy lưng trắng, rầy nâu, rầy nâu nhỏ), sâu đục thân,... mức độ gây hại nhẹ.

III. Dự báo tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới

- Chuột: Tiếp tục gây hại trên các trà lúa, đặc biệt trên những ruộng giai đoạn đứng cái - làm đòng, diện tích và mức độ hại gia tăng nếu các địa phương không tiến hành diệt chuột thường xuyên.

- Sâu cuốn lá nhỏ: dự báo sâu non lúa 2 nở rộ từ 01/5/2023, gây hại trên lúa giai đoạn đứng cái - đòng, tập trung ở những ruộng xanh tốt, bón nhiều đạm, gần làng, gần đường đi, gần ánh sáng đèn.

- Bệnh đạo ôn cổ bông: tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại đặc biệt trên những ruộng lúa đã có nguồn bệnh đạo ôn lá khi gặp điều kiện thuận lợi (nhiệt độ 24-28°C, ẩm độ cao) nên cần phải điều tra, phát hiện sớm.

- Bệnh khô vằn: tiếp tục phát triển và gây hại trên lúa, tỷ lệ bệnh và cấp bệnh tăng, đặc biệt ở những ruộng xanh tốt, bón thừa đạm, bón phân không cân đối, cây dày.

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: tiếp tục phát triển và gây hại trong thời gian tới, tỷ lệ bệnh và cấp bệnh tăng, đặc biệt trên những ruộng bón phân không cân đối, bón thừa đạm, ruộng xanh tốt.

IV. Đề nghị

1. UBND các xã, thị trấn

Trung tâm DVNN đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn thăm đồng và thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Đối với chuột: thực hiện tốt công tác diệt chuột theo Kế hoạch số 4487/KH-UBND ngày 14/11/2022 của UBND huyện Kim Thành về Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2023 và hướng dẫn kỹ thuật số 10/HD-TTĐVNN ngày 16/01/2023 của Trung tâm DV Nông nghiệp.

Lưu ý: Không được dùng điện để đánh chuột bằng mọi hình thức.

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Bà con nông dân kiểm tra trực tiếp trên ruộng nhà mình, khi lúa đang giai đoạn đứng cái - làm đòng có mật độ sâu non từ 10 - 15 con/m² thì tiến hành phun trừ. Thời gian phun trừ từ 02-06/5/2023. Có thể sử dụng một số loại thuốc để phun trừ, như: Prevathon 5SC, Vitarko 40WG, Voliam Targo 063SC,...

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Khi điều tra thấy vết bệnh chớm xuất hiện trên cổ bông cần phải phun trừ ngay bằng một số loại thuốc được đăng ký trừ bệnh đạo ôn như: Beam 75WP, Folia 525SE, Ninja 35EC, Fujione 40EC, Difusan 40EC, ... Nếu bệnh nặng phải tiến hành phun trừ lần 2, lần 2 cách lần 1 từ 3 - 5 ngày, sau khi phun gặp mưa cần phải phun lại.

- Bệnh khô vằn: Khi thấy có tỷ lệ bệnh từ 5 - 10% dành trở lên thì tiến hành phun trừ bằng một số loại thuốc như: Anvil 5SC, Hecwin 5SC, Cavil 50WP, Nevo 330EC, Tilt super 300EC, Aproach 250SC, ...

- Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi phát hiện thấy bệnh tiến hành phun trừ bằng thuốc sát khuẩn hoặc kháng sinh để hạn chế sự lây lan của bệnh, một số loại thuốc sát khuẩn như: Xanthocin 40WP, Map Lotus 125WP, Lobo 8WP, Totan 200WP, Xanthomix 20WP, ... Đối với thuốc kháng sinh có thể sử dụng các thuốc có chứa Kasugamycine, ...

2. Cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV, phân bón

Các cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV, phân bón chấp hành nghiêm luật Kiểm dịch và BVTV; không được bán các loại thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, thuốc BVTV không được phép sử dụng ở Việt Nam, các loại thuốc, phân bón hết hạn sử dụng.

Hướng dẫn người dân phun trừ thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng.

3. Người dân

Đối với lúa giai đoạn đồng - trổ cần phải giữ đủ nước để phát triển tránh hiện tượng lúa bị nghẹn đồng.

Khi sử dụng thuốc, bà con cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, liều lượng và kỹ thuật sử dụng như trên bao bì. Đặc biệt phải tuân thủ lượng nước như khuyến cáo của nhà sản xuất.

Sau khi phun thuốc BVTV, người dân phải thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV vào đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi ra bờ ruộng, nương máng gây ô nhiễm môi trường./.

Nơi nhận:

- Chi cục Trồng trọt - BVTV Hải Dương;
- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND & UBND huyện;
- VP Huyện ủy; VP HĐND & UBND huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- Chủ tịch UBND, HTXDVNN, Khuyến nông viên xã, thị trấn;
- Lưu./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Mạnh